Espirometría basal sin nebulización

PROCEDIMIENTO RESPIRATORIO PEDIÁTRICO



Imagen referencial

¿En qué consiste el procedimiento?

En este procedimiento se requiere que el niño sople, siguiendo instrucciones, para medir el volumen pulmonar y los flujos que en el se generan. Este procedimiento se realiza en pacientes desde los 3 años de edad.

La duración del procedimiento es de 30 minutos aproximadamente.

Consideraciones previas al procedimiento

El paciente no debe estar con tos que le impida soplar.

No requiere ayuno, por lo que el paciente puede alimentarse de forma habitual.

Debe evitar realizar ejercicio intenso al menos 30 minutos antes del procedimiento.

Acompañante

El paciente debe asistir acompañado por un adulto, quien permanecerá con él durante todo el procedimiento.

Julio / 2026 - Versión N°1

Medicamentos

- Traer anotados todos los medicamentos que utiliza el paciente.
- Suspender inhaladores según la indicación de la siguiente tabla:

Medicamento	Marca®	Tiempo de suspensión
Salbutamol (B2 Adrenérgico)	• AEROLIN • FESEMA • BROPIL • FLORBIN • SALBUTAMOL • SALBUTRAL	12 horas antes
Bromuro de Ipratropio	• ATROVENT • BERODUAL	12 horas antes
Corticoide + Broncodilatador de acción prolongada	• BREXOTIDE • DULERA • FLUXAMOL • RELVAR • SYM BICORT • SERETIDE • VANNAIR • VENTIDE	24 horas antes
Corticoides inhalados	• BUDESONIDA • FLUSONA • INFLAMIDE • MOMEXA	No suspender
Inhibidores de Leucotrienos	• ASVENTOL • BRONDILAT • LUKANEX • PLENAIR • SINGULAIR	No suspender
Pacientes que usan otros Corticoides, Broncodilatador o Inhalador que no figura en el listado en tabla		24 horas antes

- **Si el paciente utiliza otros medicamentos de uso habitual, no se deben suspender.**

Julio / 2026 - Versión N°1

Trámites administrativos

El paciente debe llegar con 20 minutos de anticipación a la hora agendada. No te olvides de traer la orden médica y la cédula de identidad del paciente.

Resultados

El resultado se entrega 4 días hábiles finalizado el procedimiento.