ENTEROSCOPÍA DOBLE BALÓN

Estimado paciente:

Su médico le ha indicado una enteroscopía doble balón, procedimiento endoscópico diagnóstico y terapéutico, que ayudará a tomar decisiones adecuadas a su condición.
La enteroscopía doble balón consiste en ver al interior del intestino delgado mediante un instrumento flexible diseñado para explorar, al máximo posible, el intestino.
El avance del endoscopio por el intestino delgado se logra por el inflado y desinflado de los balones que tiene el sistema. Mediante un sistema de control de presión se disminuyen los riesgos de daño del intestino.
En esta exploración del intestino delgado se buscan lesiones que puedan explicar dolor o molestias abdominales, diarreas, anemias o hemorragias digestivas.
Durante la realización de este procedimiento podría ser necesario tomar algunas muestras para biopsias que serán analizadas en el Laboratorio de Anatomía Patológica.
Dependiendo de su enfermedad y de los hallazgos, podría ser necesario realizar otros procedimientos como la extirpación de pólipos o tratamiento de lesiones sangrantes.

Antes del examen:

· Le será solicitado su consentimiento por escrito.
· Se le informará si su examen se realizará por vía oral o rectal.
· Háganos saber si presenta alguna de la s siguientes condiciones:
_____ ¿Sangra fácilmente de heridas, aún si son pequeñas?
_____ ¿Sufre de algún tipo de alergias, especialmente a medicamentos?
_____ ¿Está embarazada?
_____ ¿Sufre de alguna enfermedad respiratoria como bronquitis crónica, asma o tuberculosis?
_____ ¿Sufre de glaucoma?
_____ ¿Sufre de diabetes, enfermedades renales, cirrosis, epilepsia u otra?

Como todo procedimiento médico, pueden presentarse algunas complicaciones, las que son muy poco frecuentes. Estas incluyen: reacción alérgica o hipersensibilidad a algunos de los medicamentos administrados, hemorragias o perforación de algunos de los segmentos examinados o pancreatitis.
Nuestro equipo profesional está altamente capacitado para responder oportuna y adecuadamente ante estas complicaciones.

Es importante que siga las siguientes indicaciones:

- Enteroscopía doble balón por vía oral (boca):

Un día antes del examen:

· Suspenda medicamentos con fierro como: iberol, sulfato ferroso, confer.
· Previa autorización de su médico, suspenda medicamentos anticoagulantes (Aspirina, Neosintrón).
· Suspenda el consumo de fibras (avena, cereales, granos)
· Suspenda el consumo de frutas y verduras (crudas y cocidas)

Red Salud UC – EDU 065 – Revisado por Unidad Técnica de Educación – 2011

· Siga un régimen rico en líquido. Es decir, ingiera preferentemente sopa, jalea, té puro, café puro, galletas de agua o soda.
· En la cena ingiera sólo líquidos: sopa, jalea, té puros o café puro. No tomar leche ni yogurt.

El día del examen:

· Debe estar en ayunas.
· Debe venir acompañado por un adulto.
· Traer la orden de su médico para la realización del examen.
· Traer endoscopías y radiografías anteriores, si es que las tiene.
• Si su examen es con anestesia, debe tomar dos Fleet durante el día con al menos 7 horas de intervalo entre uno y otro, siguiendo las indicaciones.

- Enteroscopía doble balón por vía rectal:

Dos días antes del examen:

· Suspenda medicamentos con fierro como: Iberol, sulfato ferroso, Confer.
· Previa autorización de su médico, suspenda medicamentos anticoagulantes (Aspirina, Neosintrón).
· Suspenda el consumo de fibras (avena, cereales, granos)
· Suspenda el consumo de frutas y verduras (crudas y cocidas)

Un día antes del examen:

· Siga un régimen líquido. Es decir , solo puede ingerir sopa, té puro, café puro, galletas de agua o soda.
· A las 18:00 horas tome Fleet oral de la siguiente manera:
- Divida el frasco de Fleet oral en 3 vasos grandes (200 cc. como mínimo) y complete con bebidas blancas como Ginger Ale, Limón Soda o Sprite.
- Tome un vaso cada 10 minutos.
- En las horas siguientes debe tomar 2 litros de agua o jugo.
· En la cena sólo ingiera líquidos como sopa, jalea, té puro o café puro. No tomar leche ni yogurt.

El día del examen:

· A las 7:00 AM tome el segundo frasco de Fleet oral siguiendo las indicaciones anteriores
· Debe venir en ayunas.

Posterior al examen:

· No maneje durante las 6 horas siguientes del examen.
· Puede retomar su alimentación normal.
· Retire el resultado de las biopsias en caso que se hayan tomado durante el examen.
· En caso de dolor abdominal intenso, fiebre, vómitos recurrentes o sangrado digestivo comuníquese o consulte con su médico tratante o con el Servicio de Urgencia del Hospital Clínico UC

Ante cualquier duda comunicarse con el Centro de Endoscopía Digestiva UC
354 3228